

ESPECIALIDADES:

MEDICINA PALIATIVA

MEDICINA PALIATIVA

Prova: 02/Novembro/2023

Nome Legível: _____

Assinatura do candidato: _____

INSTRUÇÕES

1 - Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. Assine em seguida.

2 - O caderno de prova deverá conter 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, das quais 1(uma) só é correta.

3 - A duração da prova será de 3 horas (três horas). Ao final, haverá mais 15 (quinze) minutos para a marcação no cartão-resposta.

4 - A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.

5 - A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.

6 - Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.

7 - Em cada questão, há somente uma resposta correta. Cuidado quando transcrever para o cartão-resposta, não poderá haver rasuras.

8 - O caderno de prova deve ser entregue para o Fiscal, juntamente com o cartão-resposta.

9 - Ao receber seu cartão-resposta, aja da seguinte forma:

a) o cartão resposta deverá ser entregue com assinatura conforme os dados afixados na carteira;

b) assine no local indicado;

c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta preta, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.

d) não o amasse, nem dobre.

MODELO DO CARTÃO-RESPOSTA

01 (A) (B) (C) (D) (E)	21 (A) (B) (C) (D) (E)	41 (A) (B) (C) (D) (E)	61 (A) (B) (C) (D) (E)	81 (A) (B) (C) (D) (E)
02 (A) (B) (C) (D) (E)	22 (A) (B) (C) (D) (E)	42 (A) (B) (C) (D) (E)	62 (A) (B) (C) (D) (E)	82 (A) (B) (C) (D) (E)
03 (A) (B) (C) (D) (E)	23 (A) (B) (C) (D) (E)	43 (A) (B) (C) (D) (E)	63 (A) (B) (C) (D) (E)	83 (A) (B) (C) (D) (E)
04 (A) (B) (C) (D) (E)	24 (A) (B) (C) (D) (E)	44 (A) (B) (C) (D) (E)	64 (A) (B) (C) (D) (E)	84 (A) (B) (C) (D) (E)
05 (A) (B) (C) (D) (E)	25 (A) (B) (C) (D) (E)	45 (A) (B) (C) (D) (E)	65 (A) (B) (C) (D) (E)	85 (A) (B) (C) (D) (E)
06 (A) (B) (C) (D) (E)	26 (A) (B) (C) (D) (E)	46 (A) (B) (C) (D) (E)	66 (A) (B) (C) (D) (E)	86 (A) (B) (C) (D) (E)
07 (A) (B) (C) (D) (E)	27 (A) (B) (C) (D) (E)	47 (A) (B) (C) (D) (E)	67 (A) (B) (C) (D) (E)	87 (A) (B) (C) (D) (E)
08 (A) (B) (C) (D) (E)	28 (A) (B) (C) (D) (E)	48 (A) (B) (C) (D) (E)	68 (A) (B) (C) (D) (E)	88 (A) (B) (C) (D) (E)
09 (A) (B) (C) (D) (E)	29 (A) (B) (C) (D) (E)	49 (A) (B) (C) (D) (E)	69 (A) (B) (C) (D) (E)	89 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E)	30 (A) (B) (C) (D) (E)	50 (A) (B) (C) (D) (E)	70 (A) (B) (C) (D) (E)	90 (A) (B) (C) (D) (E)
11 (A) (B) (C) (D) (E)	31 (A) (B) (C) (D) (E)	51 (A) (B) (C) (D) (E)	71 (A) (B) (C) (D) (E)	91 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E)	32 (A) (B) (C) (D) (E)	52 (A) (B) (C) (D) (E)	72 (A) (B) (C) (D) (E)	92 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E)	33 (A) (B) (C) (D) (E)	53 (A) (B) (C) (D) (E)	73 (A) (B) (C) (D) (E)	93 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E)	34 (A) (B) (C) (D) (E)	54 (A) (B) (C) (D) (E)	74 (A) (B) (C) (D) (E)	94 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E)	35 (A) (B) (C) (D) (E)	55 (A) (B) (C) (D) (E)	75 (A) (B) (C) (D) (E)	95 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E)	36 (A) (B) (C) (D) (E)	56 (A) (B) (C) (D) (E)	76 (A) (B) (C) (D) (E)	96 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E)	37 (A) (B) (C) (D) (E)	57 (A) (B) (C) (D) (E)	77 (A) (B) (C) (D) (E)	97 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	38 (A) (B) (C) (D) (E)	58 (A) (B) (C) (D) (E)	78 (A) (B) (C) (D) (E)	98 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E)	39 (A) (B) (C) (D) (E)	59 (A) (B) (C) (D) (E)	79 (A) (B) (C) (D) (E)	99 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)	40 (A) (B) (C) (D) (E)	60 (A) (B) (C) (D) (E)	80 (A) (B) (C) (D) (E)	100 (A) (B) (C) (D) (E)

1) Adolescente de 12 anos apresenta-se com dor testicular importante, com náuseas e vômitos, de início há aproximadamente 24 horas. Ao exame físico o testículo está aumentado de tamanho, endurecido, muito sensível, dificultando o exame. Reflexo cremastérico ausente, testículo elevado. No manejo deste paciente analise as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas.

I – O tratamento cirúrgico não deve ser prioridade. PORQUE

II – A chance de ter fluxo arterial suficiente após 24 horas de evolução é mínima.

A respeito destas asserções, assinale a opção correta.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.

2) Pré escolar de 3 anos apresenta-se com quadro de febre elevada, tosse, frequência respiratória elevada, dispneia e dor abdominal. Quadro iniciou há 5 dias com sintomas respiratórios altos e que nas últimas 48 horas está ficando mais intenso, com aumento da febre, do desconforto respiratório e diminuição do apetite. Na ausculta pulmonar murmúrio vesicular diminuído em base direita, estertores esparsos, ausência de sibilos. Radiografia de tórax com consolidação em lobo inferior direito, pequeno derrame pleural ipsilateral. Foi hospitalizado e iniciado tratamento com ampicilina endovenosa. Evoluiu de forma desfavorável, com aumento importante do derrame pleural e aparecimento de focos necróticos na área de consolidação pulmonar, necessitando de abordagem cirúrgica. Qual o agente etiológico mais provável neste quadro?

- a) Staphylococcus aureus.
- b) Haemophilus influenzae.
- c) Streptococcus pyogenes.
- d) Streptococcus pneumoniae.
- e) Mycobacterium tuberculosis.

3) Cuidados paliativos para crianças são os cuidados ativos totais do corpo, da mente e do espírito da criança e também incluem dar apoio à família. Esse cuidado começa quando uma doença ou condição potencialmente fatal é diagnosticada e contínua, não importando se a criança recebe ou não tratamento direcionado à doença. Sobre este tema assinale a alternativa correta.

- a) A assistência paliativa pediátrica não deve ser prestada em ambiente ambulatorial ou domiciliar.
- b) A decisão de não reanimação deve ser perguntada aos pais / responsáveis para eles participarem da decisão.
- c) Crianças com sequelas neurológicas graves de lesão cerebral anóxica não são candidatas aos cuidados paliativos.
- d) A nutrição e hidratação artificiais são medidas de conforto, sem as quais uma criança pode sofrer de fome ou sede.
- e) Em um ambiente de UTI é possível oferecer a interrupção do que a não tem beneficiado ou aumentado a qualidade de vida.

4) Menina de 4 anos é trazida à emergência com queixas de dor abdominal difusa há 24 horas, com febre baixa, recusa alimentar, náuseas e vômitos. Ao exame dor mais acentuada à palpação de quadrante inferior direito, com sensibilidade à descompressão, sem sinais de peritonite. Hemograma com leucocitose de 15.000 e neutrófilos acima de 75%. Sobre sua principal hipótese diagnóstica, analise as afirmativas abaixo.

I – A ferramenta de primeira escolha de exame de imagem para o caso é a ultrassonografia.

II – A cirurgia deve ser realizada de forma semieletiva no período entre 12 e 14 horas do diagnóstico.

III – A utilização de analgésicos deve ser evitada para não mascarar o diagnóstico. Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

5) Lactente de 2 anos foi trazido à emergência após ter ingerido um produto de limpeza que os cuidadores não souberam informar. O acidente ocorreu há menos de uma hora e a criança apresenta-se com salivação, estridor, vômitos, muito irritada por dor na boca e abdominal, recusa para engolir. No manejo deste paciente analise as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas.

I – Após o cuidado de suporte está indicado o uso de carvão ativado 1g/kg.

PORQUE

II – O carvão vegetal tem maior probabilidade de ser eficaz quando administrado dentro de uma hora após a ingestão.

A respeito destas asserções, assinale a opção correta.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e) As asserções I e II são proposições falsas.

6) Recém nascido inicia no quinto dia de vida com congestão das conjuntivas, secreção purulenta moderada bilateral e quemose. Sem outros sintomas sistêmicos. Bacterioscopia da secreção revela-se negativa. Sobre o manejo deste paciente analise as afirmativas abaixo.

I – A ausência de bactérias torna mais provável a conjuntivite ser de origem viral ou química.

II – O tratamento deve ser realizado com azitromicina por via oral.

III – Pode evoluir com formação de pseudomembrana na conjuntiva tarsal.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.

b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.

c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.

d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

e) As afirmativas I, II e III são falsas.

7) O estado de mal epiléptico (EME) é a emergência neurológica mais frequente em crianças e o tempo está relacionado com alta mortalidade e morbidade. Sobre esta situação assinale a alternativa correta.

a) Todo paciente com EME deve realizar exame de neuroimagem.

b) A etiologia mais frequente de EME na infância é por síndromes epilépticas complexas ou metabólicas.

c) O fenobarbital não é recomendado como terapia de primeira escolha na urgência devido aos seus efeitos colaterais.

d) O tempo no qual o tratamento deve ser agressivo para prevenir as consequências a longo prazo é de 60 minutos.

e) O tempo no qual se considera uma crise como anormalmente prolongada e que determina o início do tratamento medicamentoso é de 10 minutos.

8) As vísceras maciças abdominais são proporcionalmente maiores nas crianças que nos adultos e são mais propensas a traumatismos. No atendimento da criança com trauma abdominal fechado, analise as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas.

I – O FAST mostra-se não essencial para os pacientes pediátricos para definição de indicação cirúrgica;

PORQUE

II – Existe uma consagração de tratamento conservador não operatório para a maioria das crianças com lesões de vísceras maciças.

A respeito destas asserções, assinale a opção correta.

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e) As asserções I e II são proposições falsas.

9) O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio neurobiológico com início na primeira infância. Sua apresentação pode variar significativamente de um indivíduo para outro, bem como ao longo do desenvolvimento. A queixa mais frequente dos pais de criança com TEA no segundo ou terceiro ano de vida é

a) fala repetitiva, fora de contexto e monótona, com ecolalia e alterações na prosódia.

b) alterações motoras, como marcha atípica ou na ponta dos pés e problemas posturais.

c) presença de movimentos repetitivos (estereotípias motoras) e posturas bizarras do corpo.

d) atraso para falar, acompanhado pela ausência de tentativas de compensação pela comunicação não verbal.

e) insistência em determinados rituais complexos e não funcionais, associados ao apego a rotinas rígidas e a resistência a mudanças.

10) A anafilaxia em crianças é definida como uma reação alérgica grave de aparecimento rápido e que pode causar a morte. Sobre a anafilaxia na infância analisa as afirmativas abaixo.

I – A alergia alimentar é a causa mais comum de anafilaxia fora do hospital.

II – A alergia ao látex também pode ser responsável por causar anafilaxia, especialmente em ambiente hospitalar.

III – A anafilaxia pode ocorrer sem apresentar manifestações cutâneas.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.

b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.

c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.

d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

e) As afirmativas I, II e III são falsas.

11) Maria, 82 anos, ex-tabagista, revascularizada com 1 ponte de mamária para descendente anterior e 1 ponte de safena para ramo marginal há 8 anos, recentemente submetida a cateterismo cardíaco, no qual concluiu-se que não havia vasos passíveis de angioplastia, interna pela terceira

vez nos últimos 2 meses por piora da dispneia de base. Manejo do caso com restrição sódica, diuriticoterapia de alça e ajuste nos anti-HAS. Após melhora sintomática, realizado ecocardiografia, que evidenciou fração de ejeção de 19%, além de áreas difusas de hipocinesia. Geriatra que acompanhou o caso abordou a paciente e familiares sobre cuidados paliativos antes da alta e, após esclarecimentos, definiram em conjunto que em nova internação, caso paciente evolua com piora progressiva refratária a manejo clínico, não sejam tomadas medidas invasivas, como intubação orotraqueal, ventilação mecânica ou hemodiálise. Acerca do caso e sua condução, assinale a alternativa correta.

a) A abordagem do geriatra sobre cuidados paliativos foi em momento inadequado, pois a paciente não apresentava-se em terminalidade, visto que teria alta hospitalar.

b) Caso familiares e paciente se mostrassem avessos a discussão sobre cuidados paliativos e terminalidade, o assunto deveria ser definitivamente suspenso, pois o estresse oriundo de temas difíceis e más notícias é danoso para a condução do caso a longo prazo.

c) Em caso de descompensação da condição cardíaca, caso os sintomas do paciente sejam passíveis de manejo em domicílio, não necessariamente é indicado internamento hospitalar.

d) É importante nesta situação esclarecer aos familiares e paciente que uma vez instituídos cuidados paliativos, deve-se haver foco no controle de sintomas, abdicando de qualquer terapêutica para a doença em si.

e) Caso paciente evolua com dores intratáveis, é permitido no Brasil, mediante documento assinado pelo paciente em sua consciência, ou por responsável legal, a instituição de eutanásia ativa.

12) Homem de 52 anos com história de etilismo pesado há 30 anos procura pronto socorro de hospital terciário com queixa de astenia. Questionado sobre hábito intestinal, relata recentes episódios de fezes escurecidas e fétidas. Exames de admissão evidenciavam hemoglobina 5,6g/dL, contagem de reticulócitos 4,5%(referencia: 1-2%), volume corpuscular médio 80fL, Bilirrubina total 2,1mg/dL, Bilirrubina direta 1,8mg/dL e RNI 1,7. Transfundida 1 bolsa de hemácias com melhora da astenia. Hemoglobina de controle é de 6,5g/dL.

Com relação ao caso, assinale a alternativa correta.

a) Deve ser transfundida ao menos mais uma bolsa de hemácias, visando hemoglobina maior que 7,0 g/dL.

b) Há alta suspeita de anemia hemolítica, pois existe aumento na contagem de reticulócitos e hiperbilirrubinemia direta.

c) Por tratar-se de etilista de longa data, a principal hipótese para a etiologia da anemia é a deficiência de

vitamina B12 ou folato.

d) A melhora sintomática mesmo com hemoglobina baixa sugere cronicidade da anemia e ação de mecanismos compensatórios intrínsecos.

e) Como quadro foi estabilizado com transfusão e a provável causa da anemia é a ferropenia por perda gastrointestinal, paciente deve ser imediatamente liberado com reposição de ferro oral.

13) Mulher de 67 anos, Tabagista ativa com carga acumulada de 30 anos-maço, hipertensa, procura pronto atendimento com cerca de 2 horas de evolução de palpitações. Avaliação inicial evidencia FC 160bpm, bulhas arritmicas, PA 160x90mmHg e eletrocardiograma com fibrilação atrial. Relata estar apresentando episódios semelhantes de duração mais curta e resolução espontânea nos últimos 3 meses. Com relação a condução do caso, assinale a afirmação correta.

a) Deve ser prontamente instituída cardioversão elétrica.

b) Pelo risco de aumento mais importante na resposta ventricular, deve ser instituída cardioversão farmacológica imediatamente.

c) Desde que sem contra-indicações, a paciente tem indicação de anticoagulação crônica com antagonista de vitamina K, inibidor da trombina ou inibidor do fator Xa.

d) Após sanada a condição aguda, visando menor mortalidade a longo prazo, deve-se priorizar uso de anti-arrítmicos em detrimento de estratégia de controle de frequência.

e) Caso paciente não tenha condições de arcar com custo de novos anticoagulantes e não tenha disciplina para adequado controle de TAP com a varfarina, uma boa opção é a dupla antiagregação plaquetária com AAS e clopidogrel como profilaxia para AVC cardioembólico.

14) Paciente é encaminhado da UPA para hospital terciário com suposta emergência dialítica. Trata-se de mulher de 42 anos, sem história de comorbidades conhecidas, apresentando anúria há mais de 24h. Exames realizados à admissão mostram creatinina 2,5mg/dL, ureia 95mg/dL, potássio sérico 6,2mg/dL, PH 7,3 e bicarbonato 18 mmol/L. Além da anúria, paciente refere apenas hiporexia. Com relação a este caso de insuficiência(lesão) renal aguda, assinale a afirmação correta.

a) Deve ser realizado eletrocardiograma em busca de alterações associadas a hipercalemia e, caso haja, administração de cálcio parenteral, pois este tem efeito imediato na espoliação de potássio via tubular.

b) É importante a sondagem vesical de demora para monitorização do débito urinário. No entanto, mesmo sem diurese após sondagem, não é possível afastar etiologia pós – renal.

- c) A relação ureia/creatinina elevada sugere etiologia pré-renal para a IRA. Desta forma, basta expansão volêmica com cristalóides para resolução do quadro
- d) Deve-se instituir reposição vigorosa de bicarbonato de sódio parenteral pra normalização do PH e bicarbonato.
- e) Por tratar-se de caso de hipercalemia com anúria, a hemodiálise deve ser indicada imediatamente.

15) Paciente de 32 anos procura atendimento por conta de perda ponderal importante (aproximadamente 15Kg nos últimos 6 meses) e percepção de língua esbranquiçada e disfagia para sólidos nas últimas semanas. Exames confirmaram diagnóstico de HIV. Dosado CD4 e carga viral, com valores de 80 células/mm³ e 200.000 cópias respectivamente.

Sobre a condução do caso, é correto afirmar

- a) Está indicada profilaxia para micobacteriose atípica com azitromicina.
- b) Não está indicada qualquer profilaxia para infecções oportunistas até que seja iniciada TARV e avaliada sua resposta.
- c) Se paciente trazer relato de contato com indivíduo com suspeita de tuberculose pulmonar bacilífera, deve ser iniciado esquema RIPE.
- d) Com objetivo de sigilo absoluto, dentro da equipe de saúde, apenas o médico assistente deve ter conhecimento e apresentar o diagnóstico ao paciente.
- e) A principal hipótese para a disfagia é a monilíase esofágica (esofagite por cândida), pois há grande associação de monilíase oral e disfagia com acometimento esofágico por cândida. Preferencialmente o diagnóstico deve ser confirmado por endoscopia, para diferenciação com outras infecções oportunistas.

16) As dislipidemias podem ser primárias ou secundárias a outras doenças. No Hipotireoidismo, é comum ocorrerem modificações no perfil lipídico. Com respeito à dislipidemia associada ao hipotireoidismo, analise as assertivas abaixo.

I – O hipotireodismo está associado à elevação dos níveis plasmáticos de LDL-colesterol (LDL-C). Tal situação decorre de redução de função do receptor hepático das LDL e conseqüente diminuição do clearance destas lipoproteínas.

II – O Hipotireoidismo é com frequência oligossintomático. Como regra nos pacientes cujo perfil lipídico mostra elevações de LDL-C, a função da tireóide deve ser analisada.

III – A não normalização dos níveis de LDL-C após a reposição hormonal indica possível Dislipidemia primária associada.

Selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa

II é falsa.

c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.

d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

e) As afirmativas I, II e III são falsas.

17) O teste ergométrico consiste de submeter o paciente a um incremento progressivo padronizado de esforço físico, enquanto sintomas, traçado eletrocardiográfico e pressão arterial são monitorizados. É frequentemente utilizado para diagnóstico e determinação de prognóstico na doença cardíaca isquêmica. Com respeito aos critérios de positividade do teste, analise as assertivas abaixo. São diagnósticos de resposta miocárdica isquêmica ao esforço

I – Arritmias Ventriculares complexas.

II – Supradesnivelamento do segmento ST, acima de 0,1 mV em relação à linha de base.

III – Distúrbios de condução intraventricular.

Selecione a opção correta.

a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.

b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.

c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.

d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

e) As afirmativas I, II e III são falsas.

18) Willem Einthoven desenvolveu o eletrocardiograma há mais de um século, mas o eletrocardiograma continua sendo muito útil na prática cardiológica diária. Em relação a achados do eletrocardiograma, analise as assertivas:

I. A sobrecarga atrial direita (aguda ou crônica) pode produzir aumento na amplitude da onda P (≥ 2,5 mm).

II. A sobrecarga ventricular esquerda revela diferentes critérios de voltagem baseados na existência de ondas R amplas nas derivações precordiais esquerdas e ondas S profundas nas derivações precordiais direitas.

III. O comprometimento intrínseco da condução no ramo direito do feixe de His prolonga o intervalo QRS, que passa a ter duração ≥ 160 ms, e o vetor principal do QRS orienta-se para a direita e para frente.

IV. Na Síndrome de Wolff-Parkinson-White o eletrocardiograma revela intervalo P-R curto, onda de Osborn e alargamento do complexo QRS.

Escolha entre as alternativas abaixo, as assertivas corretas.

a) I e II apenas.

b) III e IV apenas.

c) II e III apenas.

d) I, II e III apenas.

e) IV apenas.

19) A hipertensão arterial (HA) é uma das principais causas de doença no mundo, afeta mais de 1 bilhão de indivíduos e causa cerca de 9,4 milhões de mortes a cada ano. Avalie as alternativas seguintes sobre a patogenia da HA e assinale como verdadeira (V) ou falsa (F).

() O débito cardíaco e a resistência periférica são dois importantes determinantes da pressão arterial (PA)

() O efeito do sódio na PA relaciona-se com o fornecimento de sódio com cloreto; os sais de sódio sem cloreto apresentam pouco ou nenhum efeito na PA.

() A maior parte da renina na circulação é sintetizada na arteríola aferente renal, e realiza a clivagem do angiotensinogênio para formar um decapeptídeo inativo, a angiotensina I,

() A enzima conversora da angiotensina (ECA), localizada primariamente nos rins, transforma a angiotensina I em angiotensina II, um octapeptídeo ativo.

() A ECA realiza a clivagem de muitos outros peptídeos, promovendo inclusive o aumento da produção da bradicinina.

A sequência correta é:

- a) V, F, F, V, V.
- b) V, V, V, F, F.
- c) F, F, V, V, V.
- d) V, F, V, F, V.
- e) F, V, F, V, F.

20) Dentre as principais causas de hemorragia digestiva alta, as varizes esofágicas e gástricas são comumente encontradas como fonte do sangramento em pacientes com hipertensão portal, em especial portadores de cirrose hepática. Sobre o tema, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- a) Na vigência de sangramento alto proveniente de varizes esofágicas, a endoscopia digestiva alta deve ser realizada, porém sem necessidade de ligadura elástica se o paciente preferir o uso de beta bloqueadores via oral.
- b) A profilaxia primária de sangramento por varizes de esôfago deve ser feita de forma combinada, ou seja, terapia endoscópica associada a beta bloqueadores via oral.
- c) A hemorragia digestiva proveniente de varizes gástricas apresenta manejo endoscópico similar ao das varizes esofágicas, com a primeira linha de tratamento sendo a ligadura elástica.
- d) A profilaxia secundária de hemorragia digestiva por varizes esofágicas é na maioria das vezes realizada ou com terapia endoscópica ou com tratamento clínico, de forma não combinada.
- e) Em vigência de sangramento ativo por varizes eso-

fágicas é imprescindível a realização de endoscopia digestiva alta para terapia endoscópica com associação posterior de fármaco endovenoso vasoativo, por exemplo, a terlipressina.

21) Níveis elevados de prolactina circulante podem ser causados por uma grande variedade de atividades fisiológicas, incluindo gravidez, sono, alimentação e ato sexual. Sobre o aumento dos níveis de prolactina circulante, analise as seguintes afirmativas.

I – Níveis elevados de prolactina, que em geral podem levar à galactorreia, podem ser observados após estimulação da parede torácica, como na amamentação.

II – Os medicamentos que bloqueiam a ação do receptor de dopamina (fenotiazinas) ou que reduzem os níveis de catecolaminas (inibidores da monoaminooxidase) aumentam os níveis de prolactina.

III – O hipertireoidismo também está associado à elevação dos níveis séricos de prolactina.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

22) Paciente em idade reprodutiva apresenta-se em amenorreia. Na avaliação apresenta exame pélvico normal, beta HCG negativo, prolactina e TSH normais, FSH normal, testosterona e SDHEA normais. Qual o diagnóstico mais provável?

- a) Hipotireoidismo.
- b) Tumor hipofisário.
- c) Síndrome de Kallmann.
- d) Insuficiência ovariana prematura.
- e) Síndrome dos ovários policísticos.

23) Sobre causas etiológicas de dor aguda no abdome inferior e pelve, analise as afirmativas abaixo.

I – Cetoacidose diabética.

II – Transtorno psiquiátrico.

III – Abstinência de opioide.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

24) Sobre a puberdade tardia analise as afirmativa abaixo.

I – Hipogonadismo hipergonadotrófico.

II – Hipogonadismo hipogonadotrófico.

III – Adoção em países em desenvolvimento.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

25) As disfunções sexuais psiquiátricas são caracterizadas por relação sexual dolorosa ou distúrbio no desejo, na excitação, no orgasmo, ou na resolução, que causam desconforto significativo e dificuldade no relacionamento. Sobre esta situação analise as alternativas abaixo.

I - O transtorno de aversão sexual é caracterizado pela extrema aversão ou esquiva persistente ou recorrente de todo (ou quase todo) contato sexual genital com parceiro sexual.

II - O transtorno de desejo sexual hipoativo é caracterizado pelo fracasso persistente ou recorrente para adquirir ou manter uma resposta de excitação sexual de lubrificação-turgescência até consumação da atividade sexual.

III - O transtorno de excitação sexual feminina é caracterizado pela deficiência (ou ausência) persistente ou recorrente de fantasias ou desejo de ter atividade sexual.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a I está correta.
- b) Somente a I e a II estão corretas.
- c) Somente a I e a III estão corretas.
- d) Somente a II e a III estão corretas.
- e) A I, a II e a III estão corretas.

26) Sobre o crescimento das células cancerígenas sabe-se que os tumores são caracterizados por um padrão de crescimento gompertziano. Sobre esta situação analise as assertivas abaixo.

I – Quando um câncer é microscópico e não palpável, o crescimento é exponencial.

PORQUE

II – A medida que o tumor aumenta o número de suas células em fase de replicação diminui, em razão de limitações impostas por suprimento sanguíneo e aumento da pressão intersticial.

Analisando a relação proposta entre as duas asserções acima, assinale a opção correta.

- a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é falsa.
- d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é verdadeira.
- e) As duas asserções são proposições falsas.

27) Com relação à predisposição aos cânceres hereditários de mama e ovário, analise as alternativas abaixo.

I - Mulheres com ancestralidade judias Sefarditas e câncer de mama com idade menor ou igual a 40 anos.

II – Mulheres com antecedente pessoal de câncer de mama e ovário.

III – Mulheres com familiar de primeiro ou segundo grau sabidamente com mutação nos genes BRCA 1 ou BRCA 2.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

28) Com relação ao estadiamento para neoplasia trofoblástica gestacional, analise as alternativas abaixo.

I – Estadio clínico I: doença restrita ao útero.

II – Estadio clínico II: doença com extensão para fora do útero, mas limitada às estruturas genitais (anexos, vagina, ligamento largo).

III – Estadio clínico IV: doença com extensão para os pulmões, com ou sem envolvimento conhecido do trato genital.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

29) Com relação ao câncer de mama, analise as afirmativas abaixo.

I – A combinação de ressecção segmentar, linfadenectomia axilar e radioterapia pós-operatória têm a mesma sobrevida global em comparação à mastectomia com linfadenectomia axilar para o câncer de mama nos estágios I e II.

II – Os marcadores tumorais são isoladamente considerados os fatores prognósticos mais importantes para o câncer de mama.

III – As modalidades de rastreamento do câncer de mama incluem exame clínico da mama e imagem. Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

30) Com relação às recomendações sobre as terapias sistêmicas para o câncer de mama inicial,

analise as alternativas abaixo.

I – Os fatores a serem considerados ao decidir se uma paciente deve receber quimioterapia sistêmica incluem idade, estágio, perfil de biomarcador e resultados de ensaios genômicos, com o Onco-type DX ou MammaPrint.

II – O câncer de mama com receptor hormonal positivo deve ser tratado com inibidor da aromatase adjuvante em pacientes na pós-menopausa. Em pacientes na pré-menopausa o tamoxifeno deve ser administrado ou a supressão ovariana deve ser administrada em conjunto com inibidor da aromatase em pacientes de alto risco.

III – O câncer de mama HER 2 positivo deve ser tratado com terapias direcionadas ao HER2, como transtuzumabe e pertuzumabe.

Sobre esta situação selecione a opção correta.

- a) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa III é falsa.
- b) As afirmativas I e III são verdadeiras. A afirmativa II é falsa.
- c) As afirmativas II e III são verdadeiras. A afirmativa I é falsa.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são falsas.

31) A atividade física aumenta a captação de glicose pelo tecido muscular, o que pode resultar em um melhor controle glicêmico, além de diminuir o estresse e ajudar na manutenção de peso de pessoas com diabetes mellitus tipo 2.

Com relação ao exercício físico nesta população, é correto afirmar que

- a) a prática de exercícios regulares pode reduzir os níveis de HbA1c em cerca de 0,6%.
- b) atividades físicas vigorosas devem ser desestimuladas da rotina do paciente diabético.
- c) a prática semanal de 150 minutos ou mais de exercícios reduz a HbA1c em torno de 1,89%.
- d) o exercício físico não possui efeitos hipoglicemiantes comparáveis aos da maioria dos antidiabéticos orais.
- e) o indicado é que os pacientes realizem pelo menos 200 minutos semanais de exercícios moderados.

32) Quanto ao rastreamento para o câncer colorretal, analise essa sentença sobre um ensaio clínico randomizado: “During a median follow-up of 10 years, 259 cases of colorectal cancer were diagnosed in the invited group as compared with 622 cases in the usual-care group. In intention-to-screen analyses, the risk of colorectal cancer at 10 years was 0.98% in the invited group and 1.20% in the usual-care group, a risk reduction of 18% (risk ratio, 0.82; 95% confidence interval [CI], 0.70 to 0.93). The risk of death from colorectal cancer was 0.28% in the invited group and 0.31% in the usual-care group (risk ratio, 0.90; 95% CI, 0.64 to 1.16).” (October 27, 2022 N Engl J Med 2022; 387:1547-1556: Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death).

A partir deste texto, pode-se afirmar que:

- a) o grupo controle (usual-care) teve 18% das pessoas com a presença de câncer colorretal.
- b) neste estudo o rastreamento não demonstrou reduzir significativamente a morte por câncer colorretal.
- c) o grupo convidado para o rastreamento teve reduzida a incidência e a mortalidade por câncer colorretal.
- d) os dados são insuficientes para verificar se houve ou não efetividade no rastreamento para câncer colorretal.
- e) o rastreamento reduziu a prevalência da doença em 0,02% apesar da mortalidade ter sido equivalente entre os grupos.

33) Considerando a acurácia (sensibilidade e especificidade) de um teste, assinale a alternativa correta.

- a) O Fator Antinuclear tem sensibilidade de 98% para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e por isso é um teste indicado para confirmar a doença.
- b) Um teste altamente específico é adequado na avaliação inicial do diagnóstico diferencial, quando muitas possibilidades são consideradas.
- c) Um teste com alta sensibilidade deve ser utilizado quando se quer diagnosticar todos os indivíduos com a doença, sem perder casos.
- d) O resultado de um teste com alta especificidade é útil na prática clínica para afastar alguma hipótese diagnóstica se resultado negativo.
- e) A sensibilidade de um exame depende da prevalência do agravo.

34) Estudos realizados no Brasil indicam que cerca de 20% dos pacientes atendidos na Atenção Primária à Saúde tem ingestão de bebidas alcoólicas em nível considerado de alto risco. Existem diversas ferramentas para aprimorar a abordagem destes pacientes nas unidades básicas de saúde. Sobre este tópico, classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas.

I. O questionário CAGE tem finalidade de triagem, sendo considerado haver um caso de uso abusivo de álcool quando ocorrem 3 ou mais respostas positivas.

II. O AUDIT é um teste para a identificação de problemas relacionados ao uso de álcool que consiste em perguntas para avaliar o padrão de consumo nos últimos 12 meses.

III. É particularmente útil para o diagnóstico do abuso de álcool a solicitação de exames laboratoriais como hemograma, transaminases e gama-glutamilttransferase.

IV. A intervenção breve é uma estratégia terapêutica de primeira escolha estruturada por feedback, responsabilidade, aconselhamento, menu de opções, empatia e autoeficácia.

V. Tratamentos farmacológicos de transtorno de

abuso de álcool são em geral coadjuvantes, sendo uma exceção a sua maior importância durante a abordagem da síndrome de abstinência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V, V, V, V, V
- b) V, V, V, F, F
- c) V, F, V, V, F
- d) F, V, F, V, V
- e) F, F, V, V, V

35) Kaythlen, 28 anos, veio à unidade básica de saúde em busca de consulta médica para o mesmo dia porque vem apresentando há 2 dias episódios de poucos minutos de uma sensação de líquido gelado ou quente escorrendo por algum dos ombros (alternando) ou em regiões de tórax ou abdome, mesmo sem haver nenhum líquido ou alteração na pele. Revisando o prontuário, antes de atendê-la, você já verificou que ela não tem doenças crônicas, usa anticoncepcional trimestral injetável há 2 anos e já consultou 10 vezes neste ano por demandas variadas, tendo sido as mais frequentes fadiga, cefaleia e dores em algum local dos membros superiores ou inferiores.

Após ouvir tal explicação inicial dela sobre a queixa atual, estaria correto supor que:

I. será necessário investigar se não há algum problema psicológico e/ou social oculto por meio de perguntas sondando aspectos específicos do contexto familiar e laboral dela, mesmo que a paciente não forneça indicativos de questões psicossociais durante a conversa.

II. será necessário pesquisar ativamente um possível transtorno mental subjacente, pois pacientes com sintomas clinicamente inexplicados têm maior prevalência de transtornos de humor e ansiedade.

III. será essencial identificar o que Kaythlen pensa e sente sobre a queixa atual, quais as consequências em sua vida que ela já percebeu ou teme e o que ela espera da consulta de hoje.

IV. será desnecessário realizar exame físico ou solicitar exames complementares, a não ser que no restante da anamnese surja alguma hipótese diagnóstica de maior gravidade patológica.

V. caso se confirme tratar-se de um simples sintoma clinicamente inexplicado será possível orientar que o prognóstico costuma ser favorável, com remissão dos episódios em poucas semanas.

Assinale a opção abaixo que classifica corretamente as afirmativas acima como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- a) V, V, V, V, V
- b) V, F, V, F, F
- c) F, V, F, V, F
- d) F, F, V, F, V
- e) F, F, F, V, V

36) A atenção primária à saúde (APS) é definida por Barbara Starfield como a “atenção de primeiro contato, contínua, global e coordenada que se proporciona à população sem distinção de gênero, doença, ou sistema orgânico”. Em relação à APS, assinale a alternativa correta.

- a) A APS é o nível mais básico de atenção dentro de um sistema de saúde, sendo o primeiro contato do usuário com o sistema, onde os profissionais de saúde lidam com problemas simples e de fácil manejo.
- b) No Brasil, a Atenção Primária à Saúde é sinônimo de Estratégia de Saúde da Família e existe uma especialidade médica nesta área, que dá ao médico que a faz o título de especialista em saúde da família, com atuação no SUS.
- c) Dentre os atributos da APS, o acesso ou atenção de primeiro contato é o soberano. Não fornecer acesso para todos os pacientes quando eles necessitam fere um atributo essencial e faz o escore de avaliação da APS de uma região cair.
- d) A coordenação do cuidado é outro atributo da APS e consiste em fazer a gestão da saúde da população, encaminhando para o máximo de especialistas focais os seus usuários com a finalidade de obter um cuidado mais abrangente e integral.
- e) O artigo “The ecology of Medical Care”, conduzido originalmente por White e colaboradores em 1961, ressalta a importância do papel de filtro da APS, destacando que um agravamento em saúde seria melhor conduzido se visto desde o início por um subespecialista, pois evitaria complicações.

37) Joana, 55 anos, vem em consulta queixando-se de dor lombar há 7 dias. A dor se iniciou após um dia agitado, em que ajudou na organização da festa de aniversário do seu neto, tendo erguido bastante peso e brincado com as crianças. Já teve dores semelhantes anteriormente, mas sempre tomava um ibuprofeno e a dor resolvia em pouco tempo, mas desta vez não resolveu.

Sobre a abordagem da dor lombar na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Se houver descrição pela paciente de dor que irradia até a região glútea, já é possível confirmar que há associação com radiculopatia.
- b) Quando a dor piora com a movimentação, além da orientação do uso de anti-inflamatórios, a recomendação de repouso absoluto é fundamental.
- c) Como é uma lombalgia de início recente, a coleta de alguns dados como a presença de febre, o uso crônico de corticóides ou uma história de câncer não é relevante, pois não mudaria a conduta.
- d) A presença de ideias catastróficas em relação à dor e sintomas de depressão ou pessimismo são chamados de “sinais de alerta amarelos”, sendo fatores de risco para recorrência ou cronicidade que devem ser abordados pelo médico.

e) Por ser uma dor de início recente, orientações em relação a mudança de estilo de vida, como perda de peso, atividade física ou o uso de práticas integrativas e complementares (como acupuntura ou yoga) não estão indicadas por não trazerem benefício.

38) Para a Organização Mundial de Saúde, um controle efetivo do câncer só será possível mediante atenção integral ao indivíduo em todos os níveis: prevenção, abordagem diagnóstica, tratamento e até a realização de cuidados paliativos, se necessários. No que diz respeito ao câncer de colo uterino, quanto mais inicial é o diagnóstico, mais efetivo é o tratamento, o que justifica ações voltadas para a detecção precoce dessa doença. No que diz respeito às estratégias de prevenção de câncer de colo uterino em Atenção à Saúde da Mulher no SUS, podemos afirmar que:

a) a Atenção Primária a Saúde constitui-se na porta de entrada das mulheres aos serviços de saúde no país. Para tal, as unidades de saúde e seus profissionais devem estar bem preparados para ofertar campanhas de coleta de exame citopatológico do colo uterino de forma frequente e efetiva, estimulando a coleta deste exame anualmente para esta população.

b) o desenvolvimento de estratégias para a captação de mulheres na faixa etária priorizada envolve a busca ativa das mulheres na população adscrita pelos agentes comunitários de saúde (ACS) e a investigação com exame clínico das mamas e exame de Papanicolaou naquelas ainda não examinadas após o início da vida sexual ativa.

c) culturalmente, as mulheres não precisam ser estimuladas a buscarem os serviços de saúde para a promoção de saúde e a prevenção de doenças, visto serem a maioria dentre os usuários dos serviços de saúde no Brasil em virtude das campanhas e projetos de assistência implementados desde a década de 1970.

d) no Brasil, o acesso ao exame preventivo de câncer de colo uterino (Papanicolaou) tem ganhado espaço como medida de prevenção de tal forma que, somado ao estímulo a vacinação para o HPV na faixa etária preconizada, tem resultado na tendência de redução de mortalidade por câncer do colo uterino nas diversas regiões do país.

e) consultas eventuais para queixas agudas, como febre ou lombalgia, são importantes no processo de captação das mulheres, pois representam uma oportunidade para se falar de prevenção do câncer de colo uterino, sendo o ideal que a unidade de saúde se organize para propiciar a estas mulheres um acesso facilitado à coleta do citopatológico do colo do útero se indicado.

39) Maria, uma mulher de 45 anos, apresenta-se ao seu Médico de Família e Comunidade (MFC) com queixas de insônia ocasional e ansiedade modera-

da devido a estresse no trabalho. Ela está preocupada com a possibilidade de tomar medicamentos para dormir ou ansiolíticos, devido às histórias negativas que ouviu sobre a dependência e os efeitos colaterais desses medicamentos.

Qual das seguintes abordagens de Prevenção Quaternária é apropriada para o médico neste caso?

a) Realizar testes extensivos para excluir as possíveis causas orgânicas da insônia antes de considerar qualquer intervenção terapêutica, pois não há como se fazer exames demais, visto que exames não causam prejuízo para as pessoas.

b) Sugerir que Maria procure aconselhamento psicológico, independentemente de sua preferência, já que temos que entender qual o medo dela com relação a medicamentos, uma vez que eles foram aprovados para seu diagnóstico.

c) Encaminhar Maria para um especialista em sono sem discutir as opções de tratamento disponíveis, visto que problemas de sono não são prevalentes e com isso saem do escopo do que seu MFC poderia resolver.

d) Fornecer à Maria informações detalhadas sobre os benefícios e riscos dos tratamentos, incluindo a possibilidade de dependência e efeitos colaterais, permitindo que ela compartilhe da tomada de decisão.

e) Prescrever inicialmente medicamentos para dormir e ansiolíticos para aliviar os sintomas de Maria, já que os riscos e efeitos colaterais dos medicamentos são praticamente inexistentes.

40) Leopolda, uma mulher de 60 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 2 há dez anos. Apesar de seguir o tratamento prescrito e fazer acompanhamento regular com seu médico, Maria desenvolveu complicações relacionadas à diabetes, incluindo neuropatia periférica e retinopatia diabética, e assim foi encaminhada para a cirurgia de fotocoagulação de retina para tentar reduzir a progressão da cegueira dela. Considerando suas complicações relacionadas à diabetes, qual o nível de prevenção que esse procedimento está tentando atingir?

a) Prevenção primária

b) Prevenção secundária

c) Prevenção terciária

d) Prevenção quaternária

e) Prevenção quinquenária

41) Ao invés de uma estrutura anatômica distinta, é uma zona de elevada pressão localizada na extremidade inferior do esôfago, e também é constituído por 4 estruturas anatômicas.

a) Prega de Gubaroff.

b) Crura do diafragma .

c) Junção gastroesofágica .

- d) Esfíncter esofágico inferior.
- e) Membrana freno esofágica.

42) Paciente de 50 anos foi submetido a herniorrafia inguinal unilateral convencional por encarceramento agudo. O procedimento deu-se sem intercorrência e sob raquianestesia. De comorbidade prévia, relata ter hipertensão arterial em uso de Losartana. Em relação aos métodos de analgesia no pós-operatório para este paciente, assinale a assertiva correta.

- a) A meperidina é o opioide de eleição para este paciente, com boa capacidade de analgesia, custo baixo e baixa taxa de adição e dependência física.
- b) A via de administração intramuscular é a mais apropriada para este paciente, pois as doses são menos dolorosas, possuem absorção mais adequada e mais fácil administração.
- c) O tramadol pode ser realizado por via oral ou endovenosa, porém pode apresentar como efeitos colaterais náusea, prurido, sedação, confusão mental, retenção urinária e depressão respiratória.
- d) A associação de dois anti-inflamatórios não esteroidais pode ser realizado para este paciente, quando não houver resposta adequada ao uso isolado do medicamento, sem aumento do risco de ocorrências dos efeitos colaterais descritos.
- e) Pode ser utilizado anti-inflamatórios hormonais para este paciente, sendo a preferência pelo uso de hidrocortisona 500 mg endovenosa duas vezes ao dia, com boa resposta analgésica, baixo custo e baixo índice de efeitos colaterais.

43) As feridas crônicas são lesões que não conseguiram prosseguir com um processo reparador de maneira ordenada e cronológica para produzir a integridade anatômica e funcional por um período de 3 meses. Em relação a este tema, analise as assertivas abaixo.

- I) As feridas crônicas mais frequentes são as relacionadas a úlceras diabéticas, úlceras crônicas da perna secundárias á insuficiência venosa e úlceras de pressão secundárias a imobilização.
 - II) A infecção da ferida é a causa mais comum de atraso na cicatrização, pois prolonga a fase inflamatória e interfere na epitelização, contração da ferida e deposição do colágeno.
 - III) O tabagismo causa vasoconstricção periférica e uma redução do fluxo sanguíneo na ferida, porém não interfere no tempo de fechamento de feridas cicatrizando por segunda intenção.
 - IV) O diabetes melito prejudica a cicatrização, pois a oclusão de grandes vasos e a microangiopatia de órgãos terminais associados ao diabetes levam a isquemia tecidual e infecção.
- Estão corretas as assertivas:**

- a) Apenas a IV.

- b) Apenas a I e II.
- c) Apenas as III e IV.
- d) Apenas as I, II e IV.
- e) Todas estão corretas.

44) Paciente masculino, 30 anos, é submetido a laparotomia exploradora por quadro de dor abdominal em flanco direito com cinco dias de evolução. No intraoperatório observa-se grande quantidade de secreção purulenta em toda a cavidade abdominal e apendicite aguda com necrose e perfuração da base do apêndice. Em relação ao tratamento a ser realizado a este paciente, assinale a assertiva correta:

- a) Deve ser realizada restrição hídrica na reanimação deste paciente, priorizando-se o uso de soluções cristaloides.
- b) O início da antibioticoterapia deve ser realizado após o resultado da análise da cultura do líquido intracavitário, que vai nortear a escolha do agente.
- c) A antibioticoterapia deve ser iniciada após o término do procedimento cirúrgico com a confirmação do diagnóstico e a definição dos germes envolvidos.
- d) A alimentação oral deste paciente deve ser reiniciada após o retorno dos ruídos intestinais e a eliminação de gases e avançada conforme for tolerada.
- e) No intraoperatório deve ser realizada irrigação da cavidade abdominal com antibiótico de amplo espectro após a retirada do apêndice e controle da infecção.

45) No universo cirúrgico, um dos principais mecanismos de respeito a autonomia é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em relação a este instrumento da relação médico paciente, analise as assertivas abaixo.

- I) A redação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve ser realizada em termos claros e com caracteres legíveis, de modo a facilitar sua compreensão.
- II) A linguagem utilizada no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve ser a mais técnica possível, respeitando-se a literatura científica atualizada, independente da capacidade de compreensão do paciente.
- III) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve conter justificativa, objetivos e descrição sucinta, clara e objetiva do procedimento a ser realizado, omitindo-se complicações mais significativas que possam causar apreensão ao paciente.
- IV) Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o paciente não pode retirar a autorização para realização do procedimento, com exceção dos procedimentos realizados em urgência e emergência.

Estão corretas as assertivas:

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II e III.

- c) Apenas as I e IV.
- d) Apenas as II, III e IV.
- e) Todas estão corretas.

46) Masculino, 28 anos, dá entrada no pronto socorro, trazido pelo serviço pré-hospitalar, vítima de queimadura ao acender uma churrasqueira. Apresenta queimaduras de segundo grau em face, tronco anterior e membro superior direito face anterior e posterior. Encontra-se lúcido, taquicárdico e normotenso. Em relação a conduta a ser adotada a este paciente, assinale a assertiva correta.

- a) Curativos oclusivos devem sempre ser utilizados na face, utilizando-se sulfadiazina de prata.
- b) Curativos oclusivos devem sempre ser utilizados no períneo devido ao alto risco de contaminação na região.
- c) Em áreas de segundo grau superficial, curativos de membrana de celulose são ótimas alternativas para auxiliar na cicatrização.
- d) Devemos frequentemente deixar as lesões abertas para que cicatrizem mais rapidamente, entretanto, pode ser necessário analgesia mais intensa.
- e) Devemos cobrir as lesões com chumaços de algodão e ataduras de crepe e utilizar antibióticos de amplo espectro durante a resolução das áreas queimadas.

47) A cirurgia plástica reparadora emprega com muita frequência o uso de retalhos que podem ser cutâneos, musculares, musculocutâneos, fásio-cutâneos, perfurantes e até microcirúrgicos. Assinale a alternativa correta.

- a) Os retalhos rombóides aproveitam a frouxidão da pele adjacente para transferir o tecido em V-Y.
- b) Os retalhos cutâneos de avanço são retangulares ou quadrados e giram lateralmente para alcançar o defeito a ser reconstruído.
- c) O insucesso ou necrose de um retalho cutâneo não pode ser resultado do comprometimento mecânico extrínseco ao seu pedículo.
- d) Os retalhos de rotação movem-se diretamente para frente e aproveitam a elasticidade da pele para alcançar e preencher o defeito.
- e) A zetaplastia ou retalho em Z consiste na transposição de dois retalhos triangulares interdigitados sem tensão a fim de produzir um ganho no comprimento ao longo do eixo comum do Z.

48) Homem de 62 anos, admitido no pronto socorro trazido pelo SAMU, apresenta história de vômitos com sangue e fezes enegrecidas há 2 dias. Sem relato de etilismo. Diagnóstico de hepatite no passado, sem acompanhamento. À admissão, paciente sonolento, confuso, pouco colaborativo, com presença de sangue em grande quantidade em orofaringe, abertura ocular ao estímulo doloroso e localizando a dor. Abdome globoso, indolor à

palpação, com macicez móvel presente à percussão e sinal do piparote positivo. Dados vitais: FC 98 bpm, PA 88x53 mmHg, Saturando 97% em ar ambiente. Em relação a este caso clínico, analise as assertivas abaixo.

I) O paciente deve ter uma via aérea definitiva assegurada de forma precoce.

II) Na forte suspeita de hemorragia digestiva varicosa, os vasoconstrictores esplâncnicos devem ser instituídos precocemente, antes mesmo do tratamento endoscópico.

III) A endoscopia digestiva alta deve ser realizada na primeira hora da admissão, em caráter de urgência, como tratamento inicial.

IV) A presença de sangue no tubo digestivo favorece a translocação bacteriana, que pode resultar em peritonite bacteriana espontânea, estando então indicado uso de antibiótico para este paciente.

Estão corretas as assertivas:

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II e III.
- c) Apenas as III e IV.
- d) Apenas as I, II e IV.
- e) Todas estão corretas.

49) Paciente masculino, 65 anos, dá entrada no pronto socorro com queixa de dor abdominal em flanco esquerdo com 24 horas de evolução. Relata constipação desde o dia anterior com diminuição da eliminação de flatos. Relata ter realizado colonoscopia há 10 meses com achado de doença diverticular. Apresenta-se levemente taquicárdico e desidratado. Normotenso e afebril. O exame físico mostra um abdome globoso, tenso e doloroso a palpação em fossa ilíaca esquerda, com descompressão dolorosa neste local. Em relação a este caso clínico, analise as assertivas abaixo classificando-as em verdadeiro (V) ou falso (F).

() Este paciente deve ser submetido a colonoscopia durante o internamento para descartar obstrução mecânica por neoplasia colorretal.

() Espera-se, como achado laboratorial para este paciente, leucocitose e aumento de provas de atividade inflamatória, porém sem alteração da função renal

() A correção dos distúrbios hidroeletrólíticos com soluções cristaloides é a primeira atitude a ser realizada no tratamento deste paciente.

() A ultrassonografia de abdome é o exame mais indicado para este paciente após a correção hidroeletrólítica.

() A ausência de história de exteriorização retal de sangue descarta o diagnóstico de complicação de doença diverticular e leva para hipótese diagnóstica de câncer colorretal.

- a) V – F – F – V – F.
- b) F – F – V – F – F.

- c) V – F – V – V – V.
- d) V – V – V – F – V.
- e) F – V – F – F – F.

50) A distribuição inadequada de sangue oxigenado para o cérebro e outras estruturas vitais é a causa mais rápida de óbito de pacientes politraumatizados. Uma via aérea protegida e desobstruída e ventilação adequada são essenciais para prevenir a hipoxemia. Na verdade, proteger uma via aérea comprometida, fornecer oxigênio e dar suporte à ventilação tem prioridade sobre o gerenciamento de todas as outras condições. Em relação a este tema, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I) A medida de avaliação precoce mais importante é conversar com o paciente e estimular uma resposta verbal. Uma resposta verbal positiva e apropriada, com voz clara, indica que as vias aéreas do paciente estão patentes, a ventilação está intacta e a perfusão cerebral é suficiente,

PORTANTO

II) a obtenção de uma via aérea definitiva é sempre desnecessária naquele paciente vítima de trauma que se encontra consciente e lúcido.

- a) As duas assertivas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- b) As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- c) A primeira assertiva é uma proposição verdadeira, e a segunda é falsa.
- d) A primeira assertiva é uma proposição falsa, e a segunda é verdadeira.
- e) As duas assertivas são proposições falsas.

